

02.02.2021 г.

Фтизиатры ГБУЗ СО «ТПТД» в консультативно-диагностической работе используют шкалу диагностику туберкулеза, утвержденную клиническими рекомендациями «Туберкулез у взрослых» МКБ 10:A15-A19 2020 года пересмотра.

Шкала установления диагноза «Туберкулез»

Степень	Диагноз	Описание				
		Жалобы	Анамнез	Объективное обследование	Иммунодиагностика	Рентгенологические признаки
0	отсутствует	+	+	+	-	-
1	вероятный	+	+	+	+	-
2	установленный	+	+	+	+	+
3	верифицированный	+	+	+	+	+

«+» - наличие признака, «-» - отсутствие признака

0 - Диагноз отсутствует;

1 - Диагноз считается вероятным - имеются клинические признаки, подозрительные на туберкулез, и положительная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным или другие положительные тесты определения высвобождения гамма-интерферона;

2 - Диагноз считается установленным - имеются клинико рентгенологические признаки заболевания, но отсутствует бактериовыделение и гистологическое подтверждение диагноза;

3 - Диагноз считается верифицированным. - наряду с клиниколабораторными и рентгенологическими признаками туберкулеза, идентифицированы МБТ любым микробиологическим и молекулярногенетическим методом и/или получены результаты гистологического исследования, указывающие на наличие туберкулезной гранулемы в пораженном органе.